癌種	レジメン名
悪性リンパ腫	BR療法

登録番号	0602

	薬剤名	略語	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	トレアキシン	BEN	90mg/m2	点滴静注	10分かけてまたは1時間	day1、2
2	リツキシマブ	R	375mg/m2	点滴静注	初回 50mL/hで開始し、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで 2回目以降 100mL/hで開始し、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで	day1（日程変更の可能性あり）

1コースの期間	28日間
総コース数	6コース
患者条件	低悪性度B細胞性非hodgkinリンパ腫、マントル細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血病
除外基準	PSが極めて不良な場合、感染症（活動性のある）を有する場合
減量・中止基準	年齢、骨髄抑制の程度により減量または中止を考慮する
増量基準	なし
その他	感染予防のため、ST合剤、アシクロビルの予防投与を要する

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	…							28
1	生理食塩液100mL パロノセトロン静注0.75mg	●																					○
2	生理食塩液50mL トレアキシン点滴静注液	●	●																				○
3	生理食塩液　50mL ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100mg	●																					○
4	生理食塩液500mL リツキシマブ 1mg/mLの濃度に調製	●																					○